


## Perfiles de sensibilidad a antibióticos de *Klebsiella pneumoniae* en UCI 2015-2016-2017



2015    2016    2017  
n: 1166    n: 997    n: 891




Información de 29 Instituciones Hospitalarias y ocho Laboratorios Clínicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Grupo GERMEN

## Perfiles de sensibilidad a antibióticos de *Klebsiella pneumoniae* en Servicios NO UCI 2015-2016-2017



2015    2016    2017  
n: 2324    n: 2147    n: 1933



Información de 29 Instituciones Hospitalarias y ocho Laboratorios Clínicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Grupo GERMEN

<b>AMK</b>	Amikacina	<b>TGC</b>	Tigeciclina	<b>PIP/TAZ</b>	Piperacilina/tazobactam	<b>CAZ</b>	Ceftazidima	<b>CIP</b>	Ciprofloxacina	<b>IPM</b>	Imipenem
<b>ETP</b>	Ertapenem	<b>TMP/SMX</b>	Trimetoprim/sulfametoxazol	<b>FEP</b>	Cefepima	<b>CRO</b>	Ceftriaxona	<b>GEN</b>	Gentamicina	<b>MEM</b>	Meropenem

Porcentajes de aislamientos de *Klebsiella pneumoniae* productores de Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE) en los años 2015-2016-2017 según el tipo de localización, Grupo GERMEN

Localización \ Año	2015		2016		2017	
	n	%	n	%	n	%
UCI	196 / 992	19,8	178 / 915	19,4	169 / 829	20,3
Servicios NO UCI	612 / 2139	28,6	564 / 2018	27,9	474 / 1872	25,3
Pacientes ambulatorios	252 / 1454	17,3	107 / 710	15,0	120 / 676	17,7